

造影剤を用いる検査を受けられる方へ

1. 造影剤を注射する理由

今回実施する検査は造影剤というお薬を注射して行う予定です。造影剤を使用しなくても検査はできますが、より正確な診断を行うためには必要です。

2. 造影検査を受けるにあたって

絶飲食の必要な場合がありますので、お薬の服用を含め医師の指示に従ってください。

3. 検査終了後は？

普段通りの生活を送ってください。

造影剤は尿としてほぼ排泄されますので、排泄を促すために水分を多めに摂取下さい。。

4. 造影剤の副作用などについて

※造影剤は副作用の少ないものが開発され安全な薬ですが、副作用が起こることがあります。

1) 造影剤を注入すると体が熱く感じるがありますが、すぐに感じなくなりますので心配ありません。

2) 勢いよく注入するために血管外に漏れることがあります。漏れた部位が腫れて痛みが持続することもあります。通常は自然に吸収されてくるので心配ありません。漏れた量が非常に多い場合は、別の処置が必要になることもあります。

3) 副作用：吐き気、かゆみ、発疹等の軽い副作用が起こる確率は約3%です。呼吸困難、血圧低下、意識障害等の重い副作用の起こる確率は2.5万人に1人です。万が一、副作用が起こった場合には迅速かつ最善の処置を行いますので、安心して検査を受けて下さい。

4) 非常にまれですが、様々な処置を行っても病状・体質によっては40万人に1人の確率で、死亡する場合があります。

5) 過去の造影剤を使用した検査で、副作用の起きなかった方にも重い副作用が起きる可能性があります。アレルギーのある方はアレルギーのない方に比べて、重い副作用が起きる確率は高くなります。

6) 検査終了後、遅発性(30分から数日後)に頭痛、発疹、かゆみ、吐き気など症状が現れることがあります。このような病状はほとんど一時的なものなのですが、ご心配があれば下記までご連絡下さい。症状が現れた場合は、次回受診の際は医師にお知らせ下さい。

医療法人社団 如水会 今村病院 TEL 0942-825550
平日の8:30~17:00 放射線科受付
上記以外の時間 救急外来

不明な点がありましたら、主治医または検査担当者に遠慮なくご質問下さい。